

远离 麻疹



您5歲以下的孩子是否有對抗麻疹的防護力？

- 麻疹可能有危險性，對5歲以下的兒童尤其是。
- 它傳播地很快，在嚴重的情況下會導致肺炎和腦部感染。
- 大約十分之一的麻疹患者需要去醫院就診。
- 在少數情況下，麻疹有可能致命。
- 您的孩子需要接種兩劑麻疹疫苗以得到充分的保護。
- 第一劑在12個月大時接種、第二劑量在15個月大時接種。
- 如果您的孩子已經超過15個月大，還沒有接種兩劑麻疹疫苗，請與您的醫生或護士談談。

什麼是麻疹？

- 麻疹是一種極具傳染性的病毒感染。
- 它透過咳嗽和打噴嚏傳播。
- 初期症狀通常是高燒、咳嗽、流鼻涕，以及發紅、多淚的眼睛，然後臉上開始出現皮疹並往身體各部位移動。

麻疹的效力如何？

- 麻疹疫苗接種，也稱為 MMR 疫苗，保護兒童免受三種病毒感染 - 麻疹，腮腺炎和風疹。
- 該疫苗非常有效。接種一劑之後，大約95%的人可以預防麻疹，在兩劑之後，超過99%的人都受到保護。

我如何知道我的孩子是否已接種過麻疹疫苗？

- 您可查看孩子的“紐西蘭 Well Child Tamariki Ora (Plunket) 手冊”，了解孩子是否按時接種了所有疫苗。也可以詢問您的醫生。

接種麻疹疫苗有無副作用？

- 少數兒童可能會頭痛、發燒、噁心（想吐）並感到不適和疲倦。
- 有些孩子可能會出現皮疹。
- 大多數副作用只持續一兩天。

超過5歲以上的孩子如果還沒有接種麻疹疫苗，可以接種嗎？

- 年齡超過5歲的人，尤其是在年紀較大時移居紐西蘭的年輕人，可能還沒有接種過麻疹疫苗。
- 不管您多大年紀，接種麻疹疫苗十分重要，因為它極具傳染性而且傳播非常快。
- 如果您不確定自己是否打過疫苗，可詢問您的醫生。

讓孩子接種麻疹疫苗很簡單而且免費

- 您的孩子可以在您的醫生那裏免費接種麻疹疫苗。
- 許多藥店也提供麻疹疫苗。



請諮詢您的醫生、Well Child Tamariki Ora 護士或訪問您當地的藥房了解更多信息。

要了解更多信息，請登入

www.health.govt.nz/children-measles

或致電健康熱線0800 611 116